

回覧

松くい虫防除「地上薬剤散布」のお知らせ

須賀川市では、松の木を松くい虫被害から守るため、藤沼湖自然公園内において送風噴霧機による地上薬剤散布を下記のとおり実施いたします。

対象地区の皆様には御迷惑をおかけしますが、安全かつ効果的に実施したいと考えておりますので、事業の趣旨を御理解いただき、御協力をお願いします。


記

- 1 実施日時 令和6年6月18日（火）午前4時～午前11時30分
（降雨・強風時は、実施日が翌日に順延となります。また、気象状況により散布時間が遅くなることもあります。）

2 実施方法及び実施地区等

実施方法	実施地区	面積
送風噴霧機（スパウダー）による地上薬剤散布	藤沼湖自然公園内	10ha

3 散布区域図



4 御協力いただく事項

薬剤散布は人家、桑畑、畜舎、水源等を除いて安全な方法で行ないますが、被害防止のため、次の事項について御協力をお願いします。

- (1) 開放井戸の被覆や洗濯物の取り込みをお願いします。
- (2) 自動車等の駐車は御遠慮願います。また、区域内には立ち入らないでください。
- (3) 近接している桑畑は皆伐し、計画的な給葉に御協力ください。
- (4) 近接している養豚、養鶏農家等は、畜舎の餌箱に覆いをかけてください。
- (5) 近接している養蜂家は、巣箱を区域から2 km以上離れた所に移動してください。
- (6) 散布後2ヶ月間は、山菜及び家畜用飼料等の採取は御遠慮ください。

5 使用薬剤について

- (1) 散布する薬剤：スミパインマイクロカプセル剤(スミチオンを成分とする。)
- (2) 特長
 - ① 使用作業人や人畜等に対する安全性が高い。
 - ② スミチオンは、光、微生物や熱により、すみやかに分解されるため、自然環境に対する影響が少ない。
 - ③ 動物や魚類に取り込まれたスミチオンは、急速に代謝分解され排泄されるため、これらに影響を与えることは少ない。など、その安全性と使いやすさから、松くい虫防除をはじめとする森林病害虫防除用の薬剤として、最も一般的に使用されております。
- (3) 薬剤の散布量：50倍液を1 ha 当たり1, 200リットル散布

6 散布による健康被害への対応について

薬剤散布により、万一中毒症状が出た場合は、県中保健福祉事務所（TEL 75-7800）並びに公立岩瀬病院（TEL 75-3111）までご連絡のうえ、適切な処置を受けてください。

なお、中毒症状の主な例は次のとおりです。

- ①倦怠感 ②違和感 ③頭痛 ④めまい ⑤胸部圧迫感 ⑥吐き気 ⑦嘔吐
- ⑧唾液分泌過多 ⑨多量発汗 ⑩下痢 ⑪腹痛 ⑫軽い縮瞳 ⑬不安感及び軽度の運動失調などの非特異的な症状

※ 薬剤散布に関する問合せ先：須賀川市農政課 電話 0248-88-9140